

Appendix

		Alter/Jahre								
		20	30	40	50	60	70	80	85+	18-97
HGV	Prozent									
	Einseitig	0,2	./.	1,3	0,9	0,2	2,2	3,0	8,7	1,2
	Beidseitig	0,3	0,2	0,7	1,1	2,7	6,9	17,9	37,6	4,4
	Ein-/beidseitig	0,5	0,2	2,1	2,1	2,9	9,1	20,9	46,2	5,6
Hörverluste	Mittelwerte									
%PTA	Besseres Ohr	1,2	1,2	2,4	3,8	9,6	19,3	32,7	44,8	11,6
	Schlechteres Ohr	2,2	2,8	5,3	7,3	15,0	28,0	42,6	56,1	16,9
%FT	Besseres Ohr	0,9	1,1	2,9	4,6	9,8	17,9	29,7	43,4	9,3
	Schlechteres Ohr	2,1	3,3	6,2	8,4	14,7	26,2	38,6	54,5	14,0
%SRT ¹	Besseres Ohr	2,3	2,5	5,2	8,0	14,5	21,4	29,2	42,0	11,9
	Schlechteres Ohr	5,0	6,9	11,1	14,9	20,8	31,8	38,9	53,6	18,6
Prävalenz	Prozent									
WHO1	Besseres Ohr	0,5	0,9	3,5	4,5	13,8	32,5	60,3	80,1	15,6
	Schlechteres Ohr	2,8	3,5	6,8	9,4	23,2	49,1	75,3	87,6	22,8
WHO2	Besseres Ohr	0,5	0,2	1,3	1,0	2,3	7,7	24,0	51,6	5,4
	Schlechteres Ohr	0,5	2,3	3,1	3,0	5,1	17,4	37,8	63,3	9,6
GBD	Besseres Ohr	0,5	0,9	1,6	1,6	4,6	14,8	38,8	65,5	8,6
	Schlechteres Ohr	0,5	2,3	4,7	3,9	11,4	28,1	54,2	77,5	14,3
HMR ²	Besseres Ohr	2,4	2,7	8,7	15,8	39,2	67,5	82,3	92,1	29,9
	Schlechteres Ohr	5,1	6,0	20,0	31,5	58,5	81,7	92,6	97,3	41,5
FT20	Besseres Ohr	1,1	1,7	3,6	4,7	15,8	33,4	61,1	78,4	16,3
	Schlechteres Ohr	3,1	3,8	7,9	10,9	25,6	51,0	76,1	87,6	24,1
SRT-3 ¹	Besseres Ohr	5,0	5,5	12,8	18,0	41,2	71,0	90,4	96,6	33,6
	Schlechteres Ohr	10,9	12,5	26,8	40,6	64,9	92,0	97,2	100,0	48,9
SRT-4 ¹	Besseres Ohr	17,2	17,0	30,3	48,1	74,6	95,3	98,3	100,0	54,2
	Schlechteres Ohr	34,0	41,5	60,3	75,4	90,4	98,9	100,0	100,0	72,5
SHP ¹		4,7	11,4	19,2	24,0	25,7	41,3	47,0	71,3	25,5

¹N=1825 aus HÖRSTAT

²Einbezogen wurden die Luftleitungs-Schwellen bei 500, 1.000, 2.000, 3.000 und 4.000 Hz. In 36 Fällen wurde die Hörschwelle eines Ohrs bei 3000 Hz nicht erhoben. Nach Einzelprüfung wurde angenommen, dass das HMR-Kriterium in 29 Fällen höchstwahrscheinlich nicht und in sieben Fällen einseitig erfüllt war.